T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	823
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	33809
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR. MAESTRO WSF 0-30-30+(3MgO)+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:30 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:30 Suda Çözünür PotasyumOksit(K_2O) %:30
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:3
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,01 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,01 Suda Çözünür Demir(Fe):0,02 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,02 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,01
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn'in TAMAMI EDTA İLE ŞELATLIDIR
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 45 °C
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	SÜRE DOLUMU NEDENİYLE YENİLEME
Bu belge 22/05/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" geregi piyasaya arz edilen KİMYEVI GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:22/05/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER

PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

MR. MAESTRO WSF 0-30-30+(3MgO)+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	**(W/W)**
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 30
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P_2O_5)	% 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 30
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 3
Suda Çözünür Bakır Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTAŞelatlı)	% 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı)	%0,01

Şelatın Stabil olduğu pH Aralıkları

Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9),Çinko (4-11)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ



ÜRETİCİ

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA
VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
KAYAPA MAH. KAYAPA SANAYİ BLV. NO: 35 NİLÜFER/ BURSA
TEL: +905308216661

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir


DEPOLAMA

Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: 0 +45 ^{0}C (derece) olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

TESCİL NO: 33809
LİSANS NO: 823
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
PARTİ NO:
NET AĞIRLIK: 0,250- 0,30- 0,50- 1 -2 - 2,5-3- 4- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -30- 50 kg



KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Kullanımdan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali (yüksek pH) ve Kuvvetli asitlerle (düşük pH), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisine 100 ml su koyunuz, içerisine 1 veya 2 g ürün ekleyiniz. Eğer ki: çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler aldıktan sonra yapınız.

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Topraktan
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva, vb.)	-Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra -Meyve Gelişme Döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	250 g/100 L suya 250 g/100 L suya 250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme
Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı vb.)	-Çiçeklenmeden önce -Taçyapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 g/100 L suya 250 g/100 L suya 250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Taçyapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 g/100 L suya 250 g/100 L suya 250 g/100 L suya 250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme
Bağ	-Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra 3-4 uygulama	250 g/100 L suya 250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme
Kivi-İncir	- İhtiyaç duyulan her dönemde	250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme
Zeytin	- Çiçeklenmeden önce - Meyve bağladıktan sonra	250 g/100 L suya 250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme
Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 g/100 L suya 250 g/100 L suya 250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme
Muz	- İhtiyaç duyulan her dönemde	300 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme
Patates	- I. Çapadan önce - Yumru oluşumu başlangıcında	250 g/100 L suya 250 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme 2-3 kg Dönüme
Kavun-Karpuz	-İhtiyaç duyulan her dönemde	200 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme
Şeker Pancarı- Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	200 g/100 L suya	-
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra -İlk çiçeklenme başlangıcında	200 g/100 L suya 250 g/100 L suya	-
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.)	İlk çıkıştan itibaren	200 g/100 L suya	-
Mısır	5-8 yapraklı dönemde	200 g/100 L suya	-
Kesme Çicekcilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	300 g/100 L suya	2-3 kg Dönüme

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde,7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN TAR. GIDA VE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.