T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

# ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

| | |
|---|---|
| **Firmanın** | |
| Ticari Ünvanı | AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı)) | Üretici |
| Lisans No | 518 |
| **Ürünün** | |
| Türü | ORGANİK ÜRÜNLER |
| Tip İsmi | HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE |
| Cinsi | Sıvı |
| Verilen Tescil No | 2022TO2456 |
| Marka veya Ticari Adı (varsa) | MR.WİCK |
| **Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler** | |
| Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı | AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Tip İsmi | HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE |
| Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat) | Türkiye |
| **Beyan edilen özellikler** | |
| Organik Madde % | 30 |
| Organik Karbon % | 13 |
| Organik Azot % | 4 |
| Serbest Aminoasit % | 6 |
| pH | 5.1-7.1 |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri | 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 kg |
| Diğer İşaretler | Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz |
| Veriliş Nedeni | İlk Defa |
| Bu belge 13/09/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. | |

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:13/09/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANİK ÜRÜNLER
HAYVANSAL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

# MR.WİCK

| GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ | % (W/W) |
|---|---|
| Organik Madde | 30 |
| Organik Karbon | 13 |
| Organik Azot (N) | 4 |
| Serbest Amino Asitler | 6 |
| pH Aralığı | 5,1-7,1 |



ÜRETİCİ FİRMA
AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA
VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAYAPA MAH. KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA 35 1 NİLÜFER BURSA
TEL: +905308216661

**UYARILAR**

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

***ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞEBİLDİĞİ TOPRAĞA UYGULANAMAZ.**

***UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILAMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILAMAZ.**

**DEPOLAMA:**

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:
Lisans No:518
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sora 3 Yıldır.
Parti No:
Çalışma İzin No: TR-16-KC-11
Net Ağırlık: 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50 kg

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR.
GIDA VET. İLAÇ. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.

## UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU | |
|---|---|---|---|
| | | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
| NARENCİYE | Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| ELMA, ARMUT VB. | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| ŞEFTALİ ,KAYISI ,KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| BAĞ | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| ANTEP FISTIĞI ,FINDIK | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| ZEYTİN | Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| MUZ | Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| KİVİ,İNCİR | Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| DOMATES ,BİBER | -Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| HIYAR ,PATLICAN | -Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| KAVUN,KARPUZ | -Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| SÜS BİTKİLERİ VE KESME ÇİÇEKÇİLİK | -Fidelerin şaşırtılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| MERCİMEK | Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetişme peryodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| YER FISTIGI | Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetişme peryodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| PAMUK, AYÇİÇEK,MISIR VB. | Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetişme peryodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| ÇELTİK. | Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetişme peryodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| ÇAY | Yetişme peryodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| ŞEKER PANCARI | Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetişme peryodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| MEYVE FİDANLARI | Yetişme peryodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| HUBUBAT | Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetişme peryodu boyunca 2 kez yapraktan uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |
| YEŞİL ALAN BİTKİLERİ | Yetişme peryodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır. | 100-200 ml/100 lt su | 1-2 lt /dekar |

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR.
GIDA VET.İLAÇ. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.